


Beiteparasitter hos kalv og ungdyr

fortsetter fra forrige side



Har dyretettheten på beitet noe å si?

– Ja, er det mye dyr på beitet blir det større konkurranse om gras og dyra beiter nærmere møkkrøkene der en finner parasittene, samtidig som gras beites lenger ned.

Er det mulig å forutsi om det vil bli mye parasitter i beitet før utslipp?

– Parasitter som overvintrer i beitet har et begrenset lager av energi. Når det blir tilstrekkelig varmt og fuktig begynner de å forbruke energi. Skjer dette tidlig på

FAKTA

Leverikter

- Den store leverikten vanligst langs kysten opp til Lofoten (mellomvert: sumpsnegle)
- Ingen tydelige sjukdomstegn eller kronisk infeksjon (medfører kassasjon av lever) på seinvinteren etter første beitesesong. Dårlig matlyst, vektreduksjon og gradvis avmagring
- Forebygging: Drenering slik at mellomvertssneglen blir borte eller avstenging av fuktige områder. Behandling med medisiner ved innsett om høsten

■ Ved bruk av utmarksbeite til storfe midtsommers kan en unngå problemer med løpeorm og lungeorm. Foto: Solveig Goplen.

våren vil de fleste dø ut før dyra slippes ut. Er det derimot en kald april med lite regn er faren stor for mye smitte i beitet når dyra kommer ut.

Kan du si litt om forebyggende behandling?

– Det enkleste er å behandle ved beiteslipp. Hvis en bruker preparat med lang varighet vil en forebygge at dyra smittes med overvintrede løpeormlarver. Alternativet er å samle dyra for behandling i beitesesongen. Også mot koksider oppnås en viss effekt ved behandling før beiteslipp, men forebyggende behandling 2–3 dager etter beiteslipp vil ha større effekt.

Som regel vil det ikke være nødvendig å behandle mot koksider hvert år. Annenhvert år eller behandling to år og opphold ett år kan være en anbefaling. Vi må ikke glemme at det er ønskelig med en viss smittebelastning, slik at dyra kan oppnå immunitet første beitesesongen. Men det er viktig å følge med og sette inn behandling når en ser sjukdomssymptomer hos dyra. Symptomene på koksidiøse kom-

mer allerede en til to uker etter beiteslipp, mens løpeorm oftere gir symptomer som diaré og utrivelighet senere på sommeren eller på høsten.

Hvordan kan en få slått fast at det er et snylterproblem?

– Utover symptomene på sjukdom som redusert tilvekst, utrivelighet og diare kan det tas en blodprøve for å få slått fast om det er infeksjon med løpeorm, forteller professor Bjørn Gjerde. Løpeorm ødelegger slimhinnen i løpen og da lekker det ut pepsinogen. Påvisning av pepsinogen i blodprøve er en sikrere metode for å diagnostisere dette enn telling av parasittegg i avføring fra dyra.

FAKTA

Ammekuproduksjon mindre utsatt

- kalvene er yngre ved beiteslipp og tar derfor opp mindre gras med parasittsmitte
- bedre blanding av unge og eldre dyr som har god immunitet og bidrar mindre til nedsmitting av beitet

Automatisk FORING

Riktig for til riktig tid i riktig mengde.

Bedre lønnsomhet og trivsel. Vi har løsningene som passer ditt driftsopplegg og foringsregime.

tkS
AGRI VALMETAL

JF-STOLL MULLERUP

For nærmere informasjon ta kontakt med nærmeste A-K forhandler.

A-K maskiner T-mek

www.a-k.no www.reime-landteknikk.no

VitaMineral® Beite og MicroFeeder

- for økt tilvekst og bedre helse!

VitaMineral® Beite er et tilskuddsfôr sammensatt spesielt for bruk i beiteperioden. Brukt sammen med MicroFeeder fôringsautomat har praktiske forsøk vist inntil 30% større tilvekst hos kviger og ungdyr.

Kjøp!

vår beitepakke - få en sekk VitaMineral® Beite GRATIS!

Beitepakke: 200 + 25 kg VitaMineral® Beite og MicroFeeder fôringsautomat.

Forhandles av: Norgesfôr, Fiskå Mølle og andre.

MicroFeeder forhandles også av Felleskjøpet.



Etablert 1926
AS NORSK MINERALNÆRING

Hensmoen, 3516 Hønefoss
Tlf. 32 14 01 00, Faks 32 14 01 01
E-post: firmapost@normin.no

Det rette valg!



Innredning for løsdrift:

- «Den lydlose fanghekken»
- Liggebåser
- Gummimatter på rull for skrapgang
- Matter, flere modeller
- Fleksible bingeskiller/porter Fra 0,40 m til 7,00 m
- Kraftforautomat for kalv
- Rundballehekker
- Gjødselskraper

BB agro
HUSDYRTEKNIKK

Brunsbu Østre, 1735 Varteig
Telefon 69 12 68 00 – Telefaks 69 12 68 01
Trøndelag: Erling Gresseth, tlf: 918 77 315
www.bbagro.no